



DO NOT OPEN PLACEPACKS. MICE & RATS WILL CHEW THROUGH THE WRAPPER.







### RAT& VI Para ratas y ratones

### MISRAIS AMEG

¡Mata ratas y ratones!

- For Indoor & Outdoor Use Para usar dentro y fuera de la casa
- **For Control of Norway Rats, Roof Rats & House Mice**

Para el control de ratas noruegas, ratas de azotea y ratones domésticos

 Kills Anticoagulant-**Resistant Rats & Mice** 

Eficaz contra las ratas y ratones resistentes a anticoagulantes

**Active Ingredient:** 0.01% Other Ingredients...... 99.99%

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** 

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Contains 20 - 0.75 oz Bait Packs Total Net Wt 15 oz (425 g)

### **VALUE PACK!**



Baff Packs Paquetes con cebo para ratas y ratones

### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento: Guarde únicamente en su envase original, en un lugar fresco y seco, que no sea accesible ni a los niños ni a las mascotas. **Eliminación del envase: Si está vacío:** No vuelva a utilizar este envase. Tírelo a la basura u ofrézçalo para reciclar si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca elimine el producto sin usar por desagües interiores ni exteriores.

### **PRECAUCIONES**

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Puede ser nocivo si es ingerido. Manténgalo alejado de las personas, los animales domésticos y las mascotas. Lávese bien con agua y jabón luego de manipular el cebo.

> 44579 41222 FPO UPC

### PRIMEROS AUXILIOS

Cuando intente obtener tratamiento, tenga a la mano la etiqueta del producto.

- Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para
- recibir instrucciones de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba
- poco a poco un vaso de agua. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico

Si entra en con la piel

- · Quítese la ropa contaminada.
- Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de
- envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

### NOTA PARA EL MÉDICO

Este producto no es un rodenticida de tipo anticoagulante. Si se ingiere, limite la absorción mediante vómitos o lavado gástrico. Los síntomas subletales, si están presentes, son consecuencia del edema cerebral y se deben tratar en forma adecuada mediante la administración de un diurético osmótico y un corticoeseroide.

Riesgos para el medio ambiente Este producto es tóxico para los mamíferos y las aves. No lo aplique directamente al agua. Los perros y otros mamíferos depredadores y carroñeros podrían resultar envenenados si se alimentan de animales que comieron este cebo.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-974-1271.

### **ALUE PACK! VALUE PACK**



DO NOT OPEN PLACEPACKS. MICE & RATS WILL CHEW THROUGH THE WRAPPER.

### **DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner

It is a Violation or recursion and to be some processing the inconsistent with its labeling.

STOP READ THIS LABEL: Read this entire label and follow all use directions and use precautions.

IMPORTANT: DO NOT EXPOSE CHILDREN, PETS OR OTHER NONTARGET ANIMALS TO RODENTICIDES. TO HELP TO PREVENT ACCIDENTS:

- 1. Store product not in use in a location out of reach of children
- and pets.

  2. Apply bait in locations out of reach of children, pets, domestic animals and nontarget wildlife, or in tamper-resistant bait stations. These stations must be resistant to destruction by dogs and by children under six years of age, and must be used in a manner that prevents such children from reaching into bait compartments and obtaining bait. If bait can be shaken from stations when they are lifted, units must be secured or otherwise immobilized. Even stronger bait stations are needed in areas open to hoofed livestock, raccoons, bears, other potentially destructive animals, or in areas prone to
- 3. Dispose of product container and unused, spoiled, and unconsumed bait as specified on this label.

Use Restrictions: For control of mice, Norway rats and roof rats in and around homes, industrial and agricultural buildings, and similar man-made structures. This product may also be used in alleys located in urban areas, inside transport vehicles (ships, trains, aircraft), and in and around related port or terminal buildings. Do not use this product in sewers. Do not place baits in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in

direct contact with food. Do not broadcast bait.

Selection of Treatment Areas: Determine areas where mice and rats will most likely find and consume the bait. Generally, these areas are along the walls, by gnawed openings, in or beside burrows, in corners and concealed places, between floors and walls, or in locations where mice or rats or their signs have been observed. Remove as much food accessible to mice and rats as

Application Directions: No-Pest® Rat & Mouse Bait Packs do not contain an anticoagulant rodenticide. Generally, mice and rats will consume a lethal dose in a single feeding with death occurring one

HOUSE MICE: Apply one placeback per location. Two unopened placepacks may be needed at points of extremely high mouse activity. Space placements 8 to 12 feet apart in areas where mice are

active.

NORWAY & ROOF RATS: Apply 2 to 8 unopened placepacks per location. Adjust the number of placepacks used according to the level of rat feeding expected at each location. Space placements 15 to 30 feet apart in areas where rats are active.

Baiting Strategy: Highest bait consumption is expected to occur on the first day or two after treatment. After several days, inspect the



placements and replenish bait at sites where there is heavy feeding or where there is evidence of heavy feeding. Although one night's feeding will usually provide a lethal dose, maintain bait for at least a week to provide all of the mice or rats a chance to feed on the bait. Baiting should continue until all signs of feeding have ceased. Where a continuous source of infestation is present, establish permanent bait stations and replenish as needed. Collect and properly dispose of all dead mice or rats and leftover bait.

### STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store only in original container in a cool, dry place inaccessible to children and pets. Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

### RECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION. May be harmful if swallowed. Keen away from humans. domestic animals and pets. Wash thoroughly with soap and water after handling this bait.

Have label with you when seeking treatment advice.

If swallowed • Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice

Have person sip a glass of water if able to swallow Do not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor.

If on skin or

Take off contaminated clothing.

Rinse skin immediately with plenty of water for

15-20 minutes.
• Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

### NOTE TO PHYSICIAN

This product is not an anticoagulant type of rodenticide. If ingested, limit absorption by either emesis or gastric lavage. Sublethal symptoms, if present, would be the result of cerebral edema and should be treated accordingly through administration of an osmotic diuretic and corticosteroid.

### **Environmental Hazards**

This product is toxic to mammals and birds. Do not apply this product directly to water. Dogs and other predatory and scavenging mammals might be poisoned if they feed upon animals that have eaten this bait.

NOTICE: Buyer as umes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-974-1271



## Paquetes con cebo para ratas y ratones

NO ABRA LOS PAQUETES. LOS RATONES Y LAS RATAS COMEN EL PAQUETE ENTERO.

### Modo de Empleo

Se considera una violación la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

ALTO LEA ESTA ETIQUETA: Lea toda la etiqueta y siga todas las instrucciones y precauciones sobre el uso.

IMPORTANTE: NO EXPONGA RODENTICIDAS A NIÑOS, MASCOTAS, NI A NINGÚN OTRO ANIMAL QUE NO SEA EL OBJETIVO. PARA EVITAR ACCIDENTES:

- 1. Guarde el producto que no esté en uso en un lugar que se encuentre fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Coloque el cebo en lugares que se encuentren fuera del alcance de los niños, las mascotas, los animales domésticos y las especies silvestres que no sean el objetivo, o en trampas con cebo resistentes a la manipulación. Estas trampas deben ser resistentes para no ser destruidas por los perros ni por los niños menores de seis años de edad, y se deben utilizar de manera de evitar que los niños alcancen los compartimientos donde está el cebo y lo tomen. Si el cebo se puede salir de las trampas cuando se las levanta, las unidades se deben asegurar o inmovilizar de otra forma. Se necesitan trampas todavía más fuertes en zonas a las que tengan acceso ganado ungulado, mapaches, osos u otros animales potencialmente destructivos, o en zonas propensas al
- 3. Elimine el envase del producto y el cebo sin usar, deteriorado o sin consumir tal como se especifica en esta etiqueta.

vandalismo.

Limitaciones del uso: Para el control de ratones, ratas noruegas y ratas de azotea en residencias y alrededor de las mismas, en edificios industriales y agrícolas y edificaciones similares construidas por el industriales y agriculos y edinicaciones similares constituidas por hombre. Este producto también se puede usar en callejones ubicados en zonas urbanas, dentro de vehículos de transporte (barcos, trenes, aviones) y dentro y alrededor de las paredes de edificios portuarios y de terminales. No use este producto en alcantarillas. No coloque los cebos en zonas donde exista la posibilidad de contaminar alimentos o superficies que tengan contacto directo con alimentos. No disemine el cebo.

selección de las zonas de tratamiento: Determiro las zonas en las que sea más probable que los roedores encuentren y consuman el cebo. En general, esas zonas son a lo largo de muros, cerca de orificios roídos, edentro o cerca de madrigueras, en esquinas y lugares escondidos, entre pisos y paredes, o en lugares donde se hayarn visto roedores o seriales de su presencia. Retire toda la comida alternativa accesible a los roedores para en cerción. que sea posible.

Instrucciones de aplicación: Los paquetes con cebo para ratas y ratones

mismiculines be adjuscionit. Los palugées con recto para datas y lations No Pester no continena un ordentidad de tipo ambicaggulante. En general, los ratones y las ratas consumen una dosis mortal comiendo sólo una vez y la muerte ocurre uno o más días después. RATONES DOMESTICOS: Coloque un paquete con cebo por lugar. Pueden ser necesarios dos paquetes con cebo cerrados en lugares donde la actividad de los rationes sea muy alta. Separe los cebos entre 8.4.12 nice nel acreacidad de controles characteristicad.

la advividad de los fadilites Sea niny alai. Separe los cous enine 8 y 17 piese ni se zonas donde los rationes tengan advividad.

RATAS NORUEGAS Y DE AZOTEA: Coloque entre 2 y 8 paquetes con cebo cerrados por lugar. Ajuste la cartifidad per paquetes con bebo a usar de acuerdo a la cantifidad que se espere que coman las citats en cada lugar. Segare los cebos entre 15 y 30 pies en las zonas donde las ratas tengan

actividad.

Estrategia para que coman el cebo: El mayor consumo del cebo habitualmente ocurre durante el primer día o los dos primeros días del tratamiento. Después de varios días, examine los cebos y reponga el cebo en los lugares donde comieron mucho o donde sea evidente que comieron mucho. Si bien lo que comen en una sola noche habitualmente suministra una dosis mortal, mantenga el cebo por lo menos durante una semana para que todos los ratones o ratas tengan oportunidad de comerlo. El cebo se debe mantener hasta que no haya ningúin signo de que lo estén comiendo. Donde haya una fuerte constante de infestación, establezca cebos permanentes y repóngalos como sea necesario. Recoja y elimine de manera adecuada a todos los ratones y ratas muertos y el ceho sobrante

Continúa en el panel lateral



DO NOT OPEN PLACEPACKS. MICE & RATS WILL CHEW THROUGH THE WRAPPER.

> NO ABRA LOS PAQUETES. LOS RATONES COMEN EL PAQUETE ENTERO.

## Bait Packs Paquetes con cebo para ratas y ratones



READ ENTIRE LABEL ON THE OUTER PACKAGE BEFORE USING THIS PRODUCT. IT IS ILLEGAL TO SELL THESE PLACEPACKS INDIVIDUALLY.

LEA TODA LA ETIQUETA DEL ENVASE EXTERIOR ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. ES ILEGAL VENDER ESTOS PAQUETES CON CEBO EN FORMA INDIVIDUAL

Active Ingredient:

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Net Wt 0.75 oz (21.2 g)

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642 Made in the USA. Distributed by Chemsico Div. of United Industries Corp. EPA Reg No. 8845-127-9688 EPA Est. No. 67517-M0-1

©2007 UIC 19-5130

Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-974-1271.

Questions or Comments? Call 1-800-974-1271.

as ratas noruegas, las ratas de azotea y los ratones domésticos habitualmente consumen una dosts mortal en lo que comen en una sota noche, pero estos roedores pueden tardar dos o más días en morir después de consumir el cebo. Los roedores dejan de comer después de consumir una dosts tóxica. Este producto mata a las ratas y los ratones domésticos resistentes a anticoagulantes.

oduct kills anticoagulant-resistant rats and mice.

Norway rats, Roof rats and House mice usually consume a lethal dose in a single night's feeding, but it may take two or more days from the time of bait consumption for these rodents to die. Rodents cease feeding after consuming a toxic dose. This

courieue zo badneres con cepo





Contains



Contiene 20 paquetes con cebo

DO NOT OPEN PLACEPACKS. MICE & RATS WILL CHEW THROUGH THE WRAPPER.

NO ABRA LOS PAQUETES. LOS RATONES Y LAS RATA COMEN EL PAQUETE ENTERO.







¡Paquete de oferta! Contiene 20 paquetes con cebo

# RATE DUSE Bait Packs Paquetes con cebo para ratas y ratones

### **VALUE PACK!**



### RATE VIJES Para ratas y ratones



### RAT& MOUSE Baff Packs Paquetes con cebo para ratas y ratones

### **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

Almacenamiento: Guarde únicamente en su envase original, en un lugar fresco y seco, que no sea accesible ni a los niños ni a las mascotas. Eliminación del envase: Si está vacío: No vuelva a utilizar este envase. Tírelo a la basura u ofrézcalo para reciclar si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca elimine el producto sin usar por desagües interiores ni exteriores

### **PRECAUCIONES**

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Puede ser nocivo si es ingerido. Manténgalo alejado de las personas, los animales domésticos y las mascotas. Lávese bien con agua y jabón luego de manipular el cebo.

> FPO UPC 44579

### PRIMEROS AUXILIOS

Cuando intente obtener tratamiento, tenga a la mano la etiqueta del producto.

- Si es ingerido | Llame inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
  - Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso de aqua.
  - No induzca el vómito, a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico.

### Si entra en contacto con la piel o la roba

- Quítese la ropa contaminada.
- Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15-20 minutos.
- Liame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento


### NOTA PARA FI MÉDICO

Este producto no es un rodenticida de tipo anticoagulante. Si se ingiere, limite la absorción mediante vómitos o lavado gástrico. Los síntomas subletales, si están presentes, son consecuencia del edema cerebral v se deben tratar en forma adecuada mediante la administración de un diurético osmótico v un corticoeseroide.

### Riesgos para el medio ambiente

Este producto es tóxico para los mamíferos y las aves. No lo aplique directamente al agua. Los perros y otros mamíferos depredadores y carroñeros podrían resultar envenenados si se alimentan de animales que comieron este cebo.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.



Contains 20 - 0.75 oz Bait Packs Total Net Wt 15 oz (425 g)

### **VALUE PACK!** VALUE PACK!



DO NOT OPEN PLACEPACKS. MICE & RATS WILL CHEW THROUGH THE WRAPPER.

### **DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

READ THIS LABEL: Read this entire label and follow all use directions and use precautions.

IMPORTANT: DO NOT EXPOSE CHILDREN, PETS OR OTHER NONTARGET ANIMALS TO RODENTICIDES. TO HELP TO PREVENT ACCIDENTS:

- 1. Store product not in use in a location out of reach of children
- 2. Apply bait in locations out of reach of children, pets, domestic animals and nontarget wildlife, or in tamper-resistant bait stations. These stations must be resistant to destruction by dogs and by children under six years of age, and must be used in a manner that prevents such children from reaching into bait compartments and obtaining bait. If bait can be shaken from stations when they are lifted, units must be secured or otherwise immobilized. Even stronger bait stations are needed in areas open to hoofed livestock, raccoons, bears, other potentially destructive animals, or in areas prone to
- 3. Dispose of product container and unused, spoiled, and unconsumed bait as specified on this label.



placements and replenish bait at sites where there is heavy feeding or where there is evidence of heavy feeding. Although one night's feeding will usually provide a lethal dose, maintain bait for at least a week to provide all of the mice or rats a chance to feed on the bait. Baiting should continue until all signs of feeding have ceased. Where a continuous source of infestation is present, establish permanent bait stations and replenish as needed. Collect and properly dispose of all dead mice or rats and leftover bait.

### STORAGE AND DISPOSAL

Storage: Store only in original container in a cool, dry place inaccessible to children and pets. Disposal: If empty: Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

**CAUTION.** May be harmful if swallowed. Keep away from humans. domestic animals and pets. Wash thoroughly with soap and water after handling this bait

# **VALUE PACK!** Paquetes con cebo para ratas y ratones

NO ABRA LOS PAQUETES. LOS RATONES Y LAS terminales. No use este producto en alcantarillas. No coloque los cebos en RATAS COMEN EL PAQUETE ENTERO.

zonas donde exista la posibilidad de contaminar alimentos o superficies que tengan contacto directo con alimentos. No disemine el cebo.

- secured or otherwise immobilized. Even stronger bait stations are needed in areas open to hoofed livestock, raccoons, bears, other potentially destructive animals, or in areas prone to vandalism.
- Dispose of product container and unused, spoiled, and unconsumed bait as specified on this label.

Use Restrictions: For control of mice, Norway rats and roof rats in and around homes, industrial and agricultural buildings, and similar man-made structures. This product may also be used in alleys located in urban areas, inside transport vehicles (ships, trains, aircraft), and in and around related port or terminal buildings. Do not use this product in sewers. Do not place baits in areas where there is a possibility of contaminating food or surfaces that come in direct contact with food. Do not broadcast bait.

Selection of Treatment Areas: Determine areas where mice and rats will most likely find and consume the bait. Generally, these areas are along the walls, by gnawed openings, in or beside burrows, in corners and concealed places, between floors and walls, or in locations where mice or rats or their signs have been observed. Remove as much food accessible to mice and rats as nossible.

Application Directions: No-Pest® Rat & Mouse Bait Packs do not contain an anticoagulant rodenticide. Generally, mice and rats will consume a lethal dose in a single feeding with death occurring one or more days later.

HOUSE MICE: Apply one placepack per location. Two unopened placepacks may be needed at points of extremely high mouse activity. Space placements 8 to 12 feet apart in areas where mice are active.

NORWAY & ROOF RATS: Apply 2 to 8 unopened placepacks per location. Adjust the number of placepacks used according to the level of rat feeding expected at each location. Space placements 15 to 30 feet apart in areas where rats are active.

Baiting Strategy: Highest bait consumption is expected to occur on the first day or two after treatment. After several days, inspect the

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION. May be harmful if swallowed. Keep away from humans, domestic animals and pets. Wash thoroughly with soap and water after handling this bait.

### FIRST AID

Have label with you when seeking treatment advice

treatment advice.

	mave label with you when seeking treatment advice.	
		Call a Poison Control Center or doctor immediatel for treatment advice.     Have person sip a glass of water if able to swallow     On not induce vomiting unless told to do so by a Poison Control Center or doctor.
	clothing	Take off contaminated clothing.     Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.     Call a Poison Control Center or doctor for

### NOTE TO PHYSICIAN

This product is not an anticoagulant type of rodenticide. If ingested, limit absorption by either emesis or gastric lavage. Sublethal symptoms, if present, would be the result of cerebral edema and should be treated accordingly through administration of an osmothic diuretic and cordicosteroid.

### **Environmental Hazards**

This product is toxic to mammals and birds. Do not apply this product directly to water. Dogs and other predatory and scavenging mammals might be poisoned if they feed upon animals that have eaten this haif

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-974-1271.

Made in the USA. Distributed by Chemsico, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg No. 8845-127-9688

EPA Est. Nos. 67517-MO-1 (1), 74291-MO-1 (AH), 9688-MO-1 (1), 75793-MO-1 (AI), 80202-MO-1 (BX)

Circled letter is first letter of lot number. 16-9591

© 2007 UIC

### NO ABRA LOS PAQUETES. LOS RATONES Y LAS RATAS COMEN EL PAQUETE ENTERO.

### MODO DE EMPLEO

Se considera una violación la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.



LEA ESTA ETIQUETA: Lea toda la etiqueta y siga todas las instrucciones y precauciones sobre el uso.

IMPORTANTE: NO EXPONGA RODENTICIDAS A NIÑOS, MASCOTAS, NI A NINGÚN OTRO ANIMAL QUE NO SEA EL OBJETIVO. PARA EVITAR ACCIDENTES:

- Guarde el producto que no esté en uso en un lugar que se encuentre fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- 2. Coloque el cebo en lugares que se encuéntren fuera del alcance de los minos, las masorias, los animales domésticos y las especies silvestres que no sean el objetivo, o en trampas con cebo resistentes a la manipulación. Estas trampas deben ser resistentes para no ser destriudas por los perros ni por los miños menores de seis años de edad, y se deben utilizar de manera de evitar que los niños alcancen los compartimientos donde está el cebo y lo tomen. Si el cebo se puede salir de las trampas cuando se las levanta, las unidades se deben asegurar o immovilizar de otra forma. Se necesitan trampas todavía más fuertes en zonas a las que tengan acceso ganado ungulado, mapaches, osos u otros animales potencialmente destructivos, o en zonas propensas al vandalismo.
- Elimine el envase del producto y el cebo sin usar, deteriorado o sin consumir tal como se específica en esta etiqueta.

Limitaciones del uso: Para el control de ratones, ratas noruegas y ratas de azotea en residencias y alrededor de las mismas, en edificios industriales y agricolas y edificaciones similares construidas por el hombre. Este producto también se puede usar en callejones ubicados en zonas urbanas, dentro de vehículos de transporte (barros, trens, aviones) y dentro y afrededor de las paredes de edificios portuarios y de

terminales. No use este producto en alcantarillas. No coloque los cebos en zonas donde exista la posibilidad de contaminar alimentos o superficies que tengan contacto directo con alimentos. No disemine el cebo.

Selección de las zonas de tratamiento: Determine las zonas en las que sea más probable que los nedores encuentren y consuman el cabo. En general, esas zonas son a lo largo de muros, cerca de orificios roidos, dentro o cerca de mádrigueras, en esquinas y lugares escondidos, entre pisos y paredes, o en lugares donde se hayan visto roedores o señales de su presencia. Retire toda la comida alternativa accesible a los roedores que sea nosible.

Instrucciones de aplicación: Los paquetes con cebo para ratas y ratones No-Pest<sup>®</sup> no contienen un rodenticida de tipo anticoagulante. En general, los ratones y las ratas consumen una dosis mortal comiendo sólo una vez y la muerte ocurre uno o más días desoués.

RATONES DOMÉSTICOS: Coloque un paquete con cebo por lugar. Pueden ser necesarios dos paquetes con cebo cerrados en lugares donde la actividad de los ratones sea muy alta. Separe los cebos entre 8 v 12 nies en las zonas donde los ratones tenora actividad.

RÁTAS NORUEGAS Y DE AZOTEA: Coloque entre 2 y 8 paquetes con cebo cerrados por lugar. Ajuste la cantidad de paquetes con cebo a usar de acuerdo a la cantidad que se espere que coman las ratas en cada lugar. Separe los cebos entre 15 y 30 pies en las zonas donde las ratas tengan actividad.

Estrategia para que coman el cebo: El mayor consumo del cebo habitualmente ocurre durante el primer día o los dos primeros días del tratamiento Despuis de varios días, examine los cebos y reponga el cebo en los lugares donde comieron mucho o donde sea evidente que comieron mucho. Si bien lo que comen en una sola noche habitualmente suministra una dosis morda, mantenga el cebo por lo menos durante una semana para que todos los ratones o ratas tengan oportunidad de comerlo. El cebo se debe mantener hasta que no haya ningúis signo de que lo estéric comiendo. Donde haya una fuente constante de infestación, establezca cebos permanentes y repórigalos como sea necesario. Recoja y ellimine de manera adecuada a todos los ratones y ratas muertos y el cebo sohrante.

Continúa en el panel lateral